

### Razón de masculinidad de casos nuevos de SIDA

<b>Fórmula</b>	$RM^{SIDA} = \frac{Casos^N_{(m)}}{Caso^N_{(f)}}$
<b>RM<sup>SIDA</sup></b>	Razón de masculinidad de casos nuevos de SIDA
<b>Casos<sup>N</sup><sub>(m)</sub></b>	Casos nuevos de SIDA en la población masculina
<b>Casos<sup>N</sup><sub>(f)</sub></b>	Casos nuevos de SIDA en la población femenina
<b>Nota</b>	Razón de masculinidad o índice de masculinidad.
<b>Fuente</b>	Registro de Casos de SIDA de la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA.
<b>Precisiones de la fuente</b>	Tienen el propósito de dar a conocer el comportamiento de los fenómenos demográficos relacionados con la salud del país de una forma continua de las instituciones del sector salud. La periodicidad de la información anual.
<b>Interpretación</b>	Se refiere al número de casos nuevos de SIDA en varones por cada mujer. Cuando esta razón se acerca a un caso nuevo de SIDA entre varones por cada caso femenino, indica que las mujeres se están infectando casi en la misma medida que los hombres.